

DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NITƠ THỰC VẬT



CHƯƠNG 3

Cây hút dinh
dưỡng khoáng
như thế nào?



Sinh viên thảo luận

- TV hấp thu dinh dưỡng khoáng như thế nào ?
- Loại dinh dưỡng khoáng nào ?
- “Thức ăn” chín hay sống ?

- NT Thơm: dạng ion, vô cơ, dd hữu cơ trong đất
- Hưng: ion + hoặc -
- Tú: thức ăn chín,
- Kha: chín được phân hủy và hòa tan đất
- Vũ: chuyển hóa thành chất hấp thụ được
- Kim Ngân: P, K, N
- Tiến Đức: Hấp thụ qua lá và rễ
- Hồng Nhung: Chủ động và bị động
-



GIỚI THIỆU

* Học thuyết mùn, khoáng

- Jan B. van Helmont (XVII): Cây liễu/chậu 90kg đất, sau 5 năm cây liễu nặng 76,8kg, đất giảm 0,06kg
- Stephen Hales (XVIII): Nhờ không khí
- Nay, 16 nguyên tố (9 đa và 7 vi lượng)

* Các phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp phân tích tro: như phân tích đất, lá, mù (cao su)



- Phương pháp dinh dưỡng:

- + Trồng cây trong chậu: Ưu, nhược
- + Thí nghiệm đồng ruộng: Ưu, nhược
- + Nuôi cấy mô (*in-vitro*):

Motte và Robins khởi xướng (1912)

White và Gautherat (1939) lần đầu tiên thành công

- Chẩn nghiệm dinh dưỡng
- “Thực phẩm chức năng”



1. Khái niệm chung

- Các nguyên tố khoáng trong cơ thể thực vật SV tự dưỡng, chất hữu cơ (C,H,O) chiếm 90% P khô (C: 50%,): 45%, H: 7%); chất vô cơ khoáng đa lượng vài %, vi lượng $< 1 \text{ }^0/_{00}$ (Bảng sau)
- Sự tương tác giữa các chất dinh dưỡng khoáng Sự hiện diện NT này làm thay đổi hoạt động của NT khác
- Các nguyên tố khoáng tác động tương hỗ phụ trợ, đối kháng và giới hạn lẫn nhau.

Nguyên tố	Thân cây bắp (% trọng lượng khô)	Lá cây bắp (% trọng lượng khô)
O	44,40	-
C	43,60	-
H	06,20	-
N	01,50	3,2
K	0,92	2,1
P	0,20	0,31
S	0,17	0,17
Ca	0,23	0,52
Mg	0,18	0,32
Cl	0,14	-
Na	-	-
Fe	0	0,012
Mn	0,04	0,009

- **Tương hỗ phụ trợ:**

+ Hiệu ứng của NT này tăng nhờ sự hiện diện của NT khác: Bón NO_3^- dễ thẩm Ca^{2+} , K^+ ; hấp thụ P gia tăng nhờ Mg (hoạt hóa ATPase) hay “**Không lân không vô thì thôi trồng đậu**”

- **Đối kháng:** khử lẫn nhau của cation đối với thực vật


$\text{Ca} > < \text{K, Na, Mg}$

$\text{Mn} > < \text{Fe}$ trong việc tạo lập enzym

- **Giới hạn lẫn nhau**



Nguyên tố giới hạn



PERCENTAJE DE DISPONIBILIDAD

El potencial de rendimiento está determinado por la disponibilidad del elemento en menor cantidad

J VON LEIBIG



Límite de Producción

1. Khái niệm chung

- **Nhóm đa lượng** (major nutrients, primary nutrients) 9 gồm: N, P, K, S, Ca, Mg, C, H, O đây là các chất dinh dưỡng thiết yếu và cây trồng hút nhiều nhất.
 - Sinh trưởng sinh thực
- **Nhóm vi lượng** (micro nutrients) 7 gồm: Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, B, Cl cây trồng hút với lượng ít.
 - Sinh trưởng sinh sản.



2. Vai trò sinh lý của Phosphor

- Đất rất tốt có hàm lượng $\geq 0,20\%$ P_2O_5
- Đất tốt $0,10 - 0,20\%$
- Đất xấu $\leq 0,06\%$
- Lân tổng số cao đất bazan, lân dễ tiêu thấp

Dạng ion cây hấp thụ được: HPO_4^{2-} hoặc $H_2PO_4^-$



- Phosphor - trong thành phần của **axit nucleic**
- Phosphor có trong **phosphorlipid** - TP chính của membran.
- Phosphor tham gia vào **phản ứng trao đổi chất** - chất hoạt hoá **cung cấp năng lượng** (AMP, ADP, ATP).
- Phosphor - trong nhiều **coenzym**: NAD, NADP
- Hầu hết các chất glucid khi chuyển hoá đều ở dạng liên kết với nhóm phosphat (**liên kết ester**).
- Phosphor tăng khả năng **giữ nước cho tế bào** và ảnh hưởng đến quá trình biến đổi và vận chuyển glucid.
- Phosphor làm tăng **tính chống chịu** của cây
- Phân lân giúp cây **sinh trưởng mạnh hệ rễ**
- Phosphor rất cần cho các vi sinh vật trong đất hoạt động, đặc biệt các **vi sinh vật hữu ích và cố định đạm**


Động thái hút phosphor

- Cây hút phosphor mạnh nhất ở giai đoạn **cây non** và giai đoạn **sinh trưởng mạnh**, trước lúc ra hoa.
- Trước khi ra hoa cây đã hút **75 - 84%** lượng phosphor cần thiết
- Phosphor di chuyển từ **lá già về lá non**



Biểu hiện khi cây thiếu phosphor

- Lúc đầu lá có màu xanh **lục đậm**, sau chuyển sang **màu vàng**. Nếu thiếu nhiều lá có màu **ửng đỏ, huyết dụ**, sớm rụng.
- Bắt đầu từ **mép lá**, từ các **lá già** và lá trưởng thành.
- Thiếu ít cây sinh trưởng kém, chậm lớn, ít phân cành, ít đẻ nhánh, **hệ rễ sinh trưởng kém**;
- Thiếu lân cây dễ **rụng hoa, rụng quả**.
- Đối với các cây họ đậu, **thiếu lân nốt sần ít hoặc ít nốt sần hữu hiệu**.

- 
- A photograph of a corn plant growing in a field. The plant's leaves are mostly green but show significant signs of phosphorus deficiency, with several leaves exhibiting a distinct reddish-brown or purple coloration, particularly towards the base and tips. The soil around the plant is dark and appears moist.
- Deficiency Phosphorus





Biểu hiện thiếu lân ở:

Lá ngô

Cây ngô non





3. Vai trò sinh lý của Kali

- Kali có khả năng làm tăng tính thẩm thấu của dịch tế bào nên làm tăng tính chịu rét, chịu nóng, chống chịu bệnh của thực vật.
- Kali → biến đổi và vận chuyển sản phẩm quang hợp → sản phẩm đường, bột
- Kali → đến sự tổng hợp protein
- Tăng cường quá trình tổng hợp các sắc tố quang hợp
- Kali → khả năng đẻ nhánh, hình thành cành thứ cấp, hình thành bông (lúa, kê, lúa mì...), chất lượng quả, hạt.
- Cây đủ kali có thể hạn chế khả năng rụng hoa, quả; màu sắc của hoa rực rỡ hơn.

Biểu hiện của cây khi thiếu kali

- Mô cơ yếu nên dễ gãy đổ,
- Lá ngắn, bản lá hẹp,
- Lá xuất hiện những chấm đỏ sau đó khô cháy, chóp lá thường khô, khi khô màu đen.
- Khi thiếu kali có thể tích tụ amoniac trong cây, gây đầu độc cây




K - Deficiency








Biểu hiện là ngô bị thiếu Kali





Deficiency K (Potassium)

Tác động của Kali đến hình thái rễ



CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CẦN NHỚ

**PHẢI LUÔN NHỚ 3
CHẤT CƠ BẢN**



ĐẠM (N):

Thân, lá, chồi, tăng sinh khối trái

- Hoa, trái

- Nâng cao hiệu quả sử dụng phân

KALI (K):

LÂN (P):

- Phát triển rễ

- Hỗ trợ phân hóa mầm hoa



Giai đoạn sử dụng phân	ĐẠM (N) (Lá, thân, chồi)	LÂN (P) (Rễ, Hoa)	KALI (K) (Trái, Hoa và nâng cao hiệu quả sử dụng phân)	
<u>Giai đoạn sinh trưởng</u> cây con hoặc cây chưa cho trái	Cần nhiều	Cần nhưng ít hơn Đạm	Cần thấp nhất (tăng hiệu quả sử dụng N,P)	NPK 30 - 10 - 10
<u>Tạo mầm hoa, nuôi hoa</u> Cây chuẩn bị hoặc đã ra hoa	Cần nhưng ít hơn Lân	Cần nhiều	Cần thấp nhất	NPK 10 - 55 - 10
<u>Nuôi trái</u>	Cần không nhiều	Cần thấp nhất	Cần nhiều	NPK 15 - 05 - 35
<u>Tăng năng suất và chất lượng trái</u>	Không quá quan trọng	Không quá quan trọng	Cần nhiều	NPK 10 - 0 - 46

Ví dụ công thức phân cụ thể

XÁC ĐỊNH GIAI ĐOẠN VÀ LỰA CHỌN
THÀNH PHẦN CÔNG THỨC PHÂN

1. NPK 10 - 55 - 10
2. NPK 15 - 05 - 35
3. NPK 30 - 10 - 10
4. NPK 10 - 0 - 46



4. Vai trò sinh lý của Canxi

Ca có vai trò tham gia sự **hình thành tế bào**, là thành phần cấu trúc màng tế bào làm cho cây trở nên cứng cáp hơn.

- Điều tiết mạnh mẽ **quá trình trao đổi chất** của tế bào.
- Làm **giảm tính thấm** nước của tế bào, **tăng thoát hơi nước**.






Thiếu Ca

- Lá non biến dạng, nhỏ, có màu xanh lục sẫm. Lá có hình đài hoa và quả.
- Đỉnh sinh trưởng của cây bị khô. Rễ suy thoái, cổ rễ thường gãy

5. Vai trò sinh lý của Magiê

- Thành phần của phân tử **diệp lục**
- Thiếu Mg sẽ biểu hiện ngay ở lá, rõ nhất là lá trưởng thành, khả năng **quang hợp giảm**.
- Tăng hoạt tính của nhiều enzym, ảnh hưởng đến quá trình **tổng hợp protein**.
- Tăng khả năng đồng hoá N, P, K, thúc đẩy quá trình tổng hợp các **hormon** sinh trưởng và một số **vitamin**
- Mg kết hợp với chất pectin cấu tạo nên **vách tế bào**.
- Trên nền đất chua, bón phân Mg thường phát huy hiệu quả tốt.



6. *Vai trò chung của các ng.tổ vi lượng*

- Hàm lượng ít nhưng tác dụng lớn, không thể thay thế được
- Khi kết hợp với các chất hữu cơ, hoạt tính của nguyên tố vi lượng tăng lên
- Tăng cường tổng hợp các vitamine và phytohormon
- Tăng cường khả năng chống chịu của cây với điều kiện bất lợi của môi trường
- Tạo điều kiện sử dụng các phân khoáng khác có hiệu quả.





-Ca



0.1Cu



Ca

Deficiencia de Magnesio





Fe



NHỮNG TRIỆU CHỨNG THIẾU HỤT DINH DƯỠNG THỂ HIỆN TRÊN LÁ Chồi ngọn: Ca, Bo - Lá non : Cu, S, Fe, Mn - Lá già: N, P, K, Mg, Zn, Mo

Thiếu Bo:

Lá non của chồi ngọn xộp mềm, suy yếu, đỉnh sinh trưởng bị chết

Thiếu Ca:

Cây có màu xanh tối chồi non bị mất màu xanh, mép lá và đỉnh lá bị cong chết, cuối cùng là đỉnh sinh trưởng bị chết

Thiếu S:

Lá xanh nhạt hóa vàng, gân lá xanh xám, bề mặt lá không có đốm

Thiếu Fe:

Lá vàng, vùng gân gân lá màu trắng, gân lá có màu xanh đặc trưng, phiến lá không có vết đốm

Thiếu Mn:

Lá bị mất diệp lục, gân lá chính và phụ màu xanh tối biến dạng như hoa văn

Thiếu Cu:

Gân lá bị mất diệp lục, màu trắng, lá màu xanh sáng, lá bị rủ xuống và dễ bị rụng

Thiếu Zn:

Lá hẹp và nhỏ, phiến lá mỏng thiếu diệp lục, gân lá màu xanh, những đốm chết xuất hiện khắp bề mặt bao gồm gân, phiến, mép và đỉnh lá

Thiếu Mo:

Lá có màu xanh nhạt, vàng chuyển sang cam, những đốm chết xuất hiện khắp bề mặt trừ gân lá, mặt dưới gỉ nhựa, gân lá màu trắng

Thiếu Mg:

Lá bị mất diệp lục từ đỉnh và mép, gân lá xanh, đỉnh và mép bị cong xuống, nếu thiếu nặng sẽ chết, lá dễ bị rụng

Thiếu K:

Lá vàng, mép và đỉnh lá hóa nâu, xuất hiện vết đỏ gỉ sắt, phần lá đỏ bị chết và phân hủy

Thiếu P:

Cây màu xanh tối, lùn, còi cọc, lá cứng và hẹp, nếu thiếu nặng màu xanh tối chuyển sang nâu, mặt dưới màu sạm đồng

Thiếu N:

Lá nhỏ, còi cọc màu xanh nhạt không bình thường, lá cứng, đứng đứng chuyển sang vàng, khi thiếu nặng sẽ bị cháy lá



NHỮNG TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG CỦA CÂY TRỒNG THẤY ĐƯỢC TRÊN LÁ
 Trên chồi ngọn: Ca & B - Trên lá non: Cu, S, Fe, Mn - Trên lá già: N, P, K, Mg, Zn, Mo

Thiếu B:
 Lá non ở chồi ngọn mất màu và suy yếu bất đầu từ phần đáy. Chồi ngọn chết.

Thiếu S:
 Lá xanh nhạt, gân lá nhợt nhạt, không có đốm chết.

Thiếu Mn:
 Lá mất màu xanh, gân chính và gân phụ màu xanh đậm, tạo thành dạng các ô vuông.

Thiếu Zn:
 Lá hẹp và nhỏ, phiến lá mất màu xanh, gân lá vẫn xanh, các đốm chết phát triển khắp trên lá, kể cả gân lá, chóp lá và mép lá.

Thiếu Mg:
 Lá mất màu xanh bất đầu từ chót lá và mép lá, không có đốm chết. Gân lá vẫn xanh. Chót lá và mép lá hoặc phần đáy lá cong xuống. Có thể bị chết hoại (cấp tính). Lá dễ rụng.

Thiếu P:
 Cây lùn và có màu xanh đậm bất thường. Lá dựng đứng và thường bị hẹp. Lá có màu nâu hơi xanh đến đen (trường hợp nặng). Mặt dưới lá có màu sậm đồng.

Thiếu Ca: cây có màu xanh đậm, chồi non mất màu xanh, cong và chết dần ở chót lá và mép lá, cuối cùng chồi ngọn chết.

Thiếu Fe: Mất màu xanh, không có đốm, gân chính của lá còn xanh

Thiếu Cu: Mất màu xanh giữa các gân lá. Lá thường xuyên héo rũ, dễ rụng

Thiếu Mo: Lá xanh nhạt, vàng kim đến màu cam, có những đốm chết khắp bề mặt lá (trừ gân), mặt dưới lá tiết ra chất nhầy.


Thiếu K: Lá mất màu xanh, có những đốm chết nhỏ ở chót lá và mép lá, lá có màu nâu rỉ sét, mép lá và chót lá cong, đến sóng.

Thiếu N: Cây lùn, có màu xanh lợt bất thường. Lá dựng đứng, màu xanh nhạt đến vàng, bị cháy trong trường hợp nặng.

MICRONUTRIENT TECHNOLOGY KONDHWA, KHURD POONA



- N



-Fe



-Ca



0.1 Cu



- P



- Mo



-Mg



0.1 B



- K



- S




-Zn




-Mn

7. Nitơ (N_2)

- Nguồn nitơ trong tự nhiên



Cách cố định đạm ở rễ cây họ đậu



7.1 Sự cố định nitơ phân tử

- Vi khuẩn sống tự do trong đất: *Azotobacter* (hảo khí) và *Clostridium* (yếm khí).
- Nhóm này cố định được khoảng 10 - 20 Kg N/ha/năm
- Tảo lam sống tự do hoặc cộng sinh như *Anabaena*, *Clostric*, *Nostoc*... đặc biệt là tảo lam sống cộng sinh với bèo hoa dâu (*Anabeana azollae*)
- Vi khuẩn sống cộng sinh với rễ cây họ đậu (*Rhizobium*).
- Cố định được 80 -100 kg N/ha/năm.



7.2. Sự đồng hoá nitơ của thực vật

- Rễ TV bậc cao hút NO_3 , nhưng cây trao đổi chất bằng NH_4




Quá trình này cần enzym, nguyên tố làm xúc tác như Mo, Cu, Fe, Mg, Mn và năng lượng do quá trình hô hấp cung cấp.


Đồng hoá amon (NH_4)

- Kết hợp với ceto-acid tạo thành các acid amin
 $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO} - \text{COOH} + \text{NH}_4 \longrightarrow \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{NH}_2 - \text{COOH} + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{HOOC} - \text{CH} = \text{CH} - \text{COOH} + \text{NH}_4 \longrightarrow \text{HOOC} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{NH}_2 - \text{COOH}$
- **Phân urea** $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ là dạng phân đạm khá phổ biến hiện nay. Khi bón urea vào đất, chúng sẽ kết hợp với CO_2 dạng tan trong nước (H_2CO_3) để tạo thành **amon**
- $(\text{NH}_2)_2\text{CO} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{NH}_4\text{CO}_3 \quad 2 \text{NH}_4^+ + 2 \text{CO}_3$

Sự hút khoáng của thực vật



Chất khoáng tồn tại trong đất



Vai trò hệ rễ trong sự hút khoáng

- Tạo ra $\text{H}_2\text{CO}_3 \longrightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ trao đổi với ion khoáng trong đất
- Tiết ra acid hữu cơ, enzym chuyển hóa một số chất khó tan $\longrightarrow$ dễ tan
- Cộng sinh với vi khuẩn và vi nấm tăng quá trình chuyển hóa chất khoáng

Một số kiểu cộng sinh

TABLE 12.2

Examples of organisms that can carry out nitrogen fixation

Symbiotic nitrogen fixation	
Host plant	N-fixing symbionts
Leguminous: legumes, <i>Parasponia</i>	<i>Azorhizobium</i> , <i>Bradyrhizobium</i> , <i>Photorhizobium</i> , <i>Rhizobium</i> , <i>Sinorhizobium</i>
Actinorhizal: alder (tree), <i>Ceanothus</i> (shrub), <i>Casuarina</i> (tree), <i>Datisca</i> (shrub)	<i>Frankia</i>
<i>Gunnera</i>	<i>Nostoc</i>
<i>Azolla</i> (water fern)	<i>Anabaena</i>
Sugarcane	<i>Acetobacter</i>
Free-living nitrogen fixation	
Type	N-fixing genera
Cyanobacteria (blue-green algae)	<i>Anabaena</i> , <i>Calothrix</i> , <i>Nostoc</i>
Other bacteria	
Aerobic	<i>Azospirillum</i> , <i>Azotobacter</i> , <i>Beijerinckia</i> , <i>Derxia</i>
Facultative	<i>Bacillus</i> , <i>Klebsiella</i>
Anaerobic	
Nonphotosynthetic	<i>Clostridium</i> , <i>Methanococcus</i> (archaebacterium)
Photosynthetic	<i>Chromatium</i> , <i>Rhodospirillum</i>

8. Sự hút khoáng của rễ cây

- **Giai đoạn I:** các ion khoáng được hấp thụ lên bề mặt NSC của rễ (chủ yếu bề mặt lông hút), giai đoạn này còn gọi là giai đoạn **hấp phụ trao đổi**. Hệ rễ dùng H^+ và HCO_3^- do hô hấp của rễ tạo ra để trao đổi với các ion trong đất;
- **Giai đoạn II:** các chất khoáng **xâm nhập vào** bề mặt NSC, xâm nhập vào trung chất, nội chất và không bào;
- **Giai đoạn III:** các ion khoáng kết hợp với chất hữu cơ trong tế bào nhu mô rễ để **tạo thành hợp chất hữu cơ** (cơ kim - hữu cơ hoá) để đi vào mạch dẫn.

9. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến sự hút khoáng của rễ cây

- ảnh hưởng của nhiệt độ

Nhiệt độ thích hợp

Nhiệt độ quá thấp

Nhiệt độ quá cao

- ảnh hưởng của pH môi trường

- ảnh hưởng của hàm lượng oxy trong đất


- ảnh hưởng của nồng độ chất tan trong đất

- ảnh hưởng của ánh sáng




Nhiệt độ

Tối ưu 35 - 40°C




pH của đất:



pH của đất:

- pH = 6.5-7 tốt nhất:
NPK (đa lượng) tan tốt,
Vi lượng tan vừa;
VSV có lợi hoạt
động mạnh
- Loại phân chua sinh lý
và kiềm sinh lý



→ điều chỉnh pH của đất nhất là sau vụ trồng trọt.

Sự dinh dưỡng khoáng ngoài rễ

- Chất khoáng đi vào trong lá qua **khí khổng** và khuếch tán qua **lớp cutin và biểu bì lá**.
Sự xâm nhập chất khoáng vào lá ở **mặt dưới lá** nhanh hơn và nhiều hơn mặt trên
- **Tốc độ hấp thụ** dinh dưỡng qua lá phụ thuộc vào thành phần muối, nồng độ của dung dịch, độ pH của dung dịch và tuổi lá.
- Sử dụng được với dạng **phân tan** trong nước, phụ thuộc nhiều vào điều kiện **thời tiết**, chỉ sử dụng với lượng nhỏ và đòi hỏi kĩ thuật sử dụng phù hợp.

10. Cơ sở bón phân hợp lý

$$\text{Nhu cầu của cây} = \frac{NCC - KND}{K}$$

trong đó: *NCC*: nhu cầu của cây

KND: khả năng cung cấp của đất

K: hệ số sử dụng phân bón}

- Loại cây trồng
- Giai đoạn sinh trưởng
- Thời tiết
- Loại đất
- Cân đối giữa các nguyên tố khoáng



Xác định tỷ lệ các loại phân bón và thời kỳ bón phân

- **Tỷ lệ phân bón:**

N:P:K tối ưu cho từng giống cây trồng, cho các giai đoạn sinh trưởng khác nhau

- **Thời kỳ bón phân:**

Mỗi thời kỳ sinh trưởng, cây trồng cần các chất dinh dưỡng khác nhau với lượng bón khác nhau

Thời kỳ khủng hoảng

Thời kỳ hiệu suất cao nhất.

Cần ưu tiên bón phân



- **Thời kỳ khủng hoảng** của một yếu tố dinh dưỡng là thời kỳ mà nếu thiếu nó thì ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng và năng suất (P: Lúa làm đòng, N: đẻ nhánh, làm đòng)
- **Thời kỳ hiệu suất cao nhất** là thời kỳ mà yếu tố dinh dưỡng đó phát huy hiệu quả cao nhất, lượng chất dinh dưỡng cần ít nhất cho một đơn vị sản phẩm thu hoạch nên đầu tư phân bón đạt hiệu quả cao nhất (B, Fe, N: đẻ nhánh, làm đòng)





Phương pháp bón phân thích hợp

- Bón lót: lân, vôi, phân chuồng (bón toàn bộ), N, K (bón ít)
- Bón thúc: N, K,...
- Phun phân qua lá: rau, cây hoa, cây giống các loại... ,
 vi lượng
 chất điều hòa sinh trưởng



Đất có vấn đề - đất phèn, mặn ?

Bảng so màu N của lá lúa



NHỮNG CHỮNG THIẾU DINH DƯỠNG THE HIỆN TRÊN LÁ
Chồi ngọn: Ca, Bo - Lá non : Cu, S, Fe, Mn - Lá già: N, P, K, Mg, Zn, Mo

Thiếu Bo:

Lá non của chồi ngọn xốp mềm, suy yếu, đỉnh sinh trưởng bị chết

Thiếu Ca:

Cây có màu xanh tối chồi non bị mất màu xanh, mép lá và đỉnh lá bị cong chết, cuối cùng là đỉnh sinh trưởng bị chết

Thiếu S:

Lá xanh nhạt hóa vàng, gân lá xanh xám, bề mặt lá không có dóm

Thiếu Fe:

Lá vàng, vùng gân gân lá màu trắng, gân lá có màu xanh đặc trưng, phiến lá không có vết dóm

Thiếu Mn:

Lá bị mất diệp lục, gân lá chính và phụ màu xanh tối biến dạng như hoa văn

Thiếu Cu:

Gân lá bị mất diệp lục, màu trắng, lá màu xanh sáng, lá bị rủ xuống và dễ bị rụng

Thiếu Zn:

Lá hẹp và nhỏ, phiến lá mỏng thiếu diệp lục, gân lá màu xanh, những dóm chết xuất hiện khắp bề mặt bao gồm gân, phiến, mép và đỉnh lá

Thiếu Mo:

Lá có màu xanh nhạt, vàng chuyển sang cam, những dóm chết xuất hiện khắp bề mặt trừ gân lá, mặt dưới gỉ nhựa, gân lá màu trắng

Thiếu Mg:

Lá bị mất diệp lục từ đỉnh và mép, gân lá xanh, đỉnh và mép bị cong xuống, nếu thiếu nặng sẽ chết, lá dễ bị rụng

Thiếu K:

Lá vàng, mép và đỉnh lá hóa nâu, xuất hiện vết đỏ gỉ sắt, phần lá đó bị chết và phân hủy

Thiếu P:

Cây màu xanh tối, lùn, còi cọc, lá cứng và hẹp, nếu thiếu nặng màu xanh tối chuyển sang nâu, mặt dưới màu sam đồng

Thiếu N:

Lá nhỏ, còi cọc màu xanh nhạt không bình thường, lá cứng, đứng đờng chuyển sang vàng, khi thiếu nặng sẽ bị cháy lá



11. CẢI TẠO ĐẤT

SV thảo luận

- Đất mặn kiềm, cải tạo

- Kha: Ngăn mặn, bón vôi, nước rửa, kiềm mặn, bón lân
- Kim Ngân: chọn chịu/mặn kiềm, cày xới đất.

- Đất phèn, cải tạo

- + Trí: Bón phân N, P
- + Hòe: Rửa, bón vôi, cày đất, lên luống, phơi đất, bón chuồng, sinh học
- + Vũ = Hòe
- + Kim Ngân: Bón lân



11. CẢI TẠO ĐẤT

11.1. Đất mặn kiềm

- Chứa nhiều Na_2CO_3 , NaHCO_3 ... có pH khá cao, cây khó sinh trưởng và phát triển.
- Muối làm thành những đốm trắng xóa nổi lên trên mặt đất khi trời nắng khô thành những váng trắng.

=> **Cải tạo**

- Dùng $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, CaCO_3 tách Na^+ ra khỏi keo đất



- Na_2SO_4 dễ tan, dễ bị rửa trôi khi kết hợp với rửa mặn.



Hình 1: Xổ cạn khô nước trên bề mặt ruộng



Hình 2: sử dụng bột đá vôi


11. CẢI TẠO ĐẤT

11.2. Đất phèn

- Trong đất có nhiều muối phèn, hàm lượng lưu huỳnh (S) lớn, lượng sắt (Fe^{3+}), muối (NaCl) cao.
- Hàm lượng CaCO_3 thấp, nghèo lân và chua hoặc rất chua.

=> Cải tạo

- Vôi có tác dụng làm giảm độ chua, kết tủa Fe^{3+} , Al^{3+} di động, cải thiện lý tính của đất.



- Kết hợp bón vôi với tháo chua rửa phèn thì sẽ đạt kết quả cao.
- Bón lân cần phải bón sớm và bón lượng nhiều thì mới đạt kết quả cao.



Hình 3: Phẫu diện đất phèn



Hình 4: Lên luống



Hình 5: Bón phân thích hợp



Không lân
không vôi
thì thôi trồng đậu



“Không lân, không vô thì thôi trồng đậu!”

▪ Lân

- Rất cần cho sự phát triển của bộ rễ.
- Thúc đẩy hoạt động của vi khuẩn nốt sần.
- Làm tăng khả năng cố định đạm, chống hạn.
- Thiếu lân dẫn đến đạm được tích lũy kém, sẽ hạn chế sinh tổng hợp lipid và protein trong hạt.

▪ Vô

- Điều chỉnh pH đất, giúp vk nốt sần phát triển thuận lợi.
- Cung cấp Ca cho cây đậu (quan trọng của vỏ quả đậu).
- Phòng trừ sâu bệnh hại
- Làm tăng hiệu quả sử dụng lân, nâng cao năng suất, chất lượng đậu.

- Ôn tập

